

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許番号

特許第3374177号
(P3374177)

(45)発行日 平成15年2月4日(2003.2.4)

(24)登録日 平成14年11月29日(2002.11.29)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I
A 0 1 K 67/033	5 0 1	A 0 1 K 67/033 5 0 1
C 1 2 N 15/09	Z N A	C 1 2 Q 1/68 A
C 1 2 Q 1/68		C 1 2 N 15/00 Z N A A

請求項の数2(全17頁)

(21)出願番号	特願2000-59239(P2000-59239)	(73)特許権者	501167644 独立行政法人農業生物資源研究所 茨城県つくば市観音台2丁目1-2
(22)出願日	平成12年3月3日(2000.3.3)	(72)発明者	山本 俊雄 長野県松本市中山字二山1147-25
(65)公開番号	特開2001-245550(P2001-245550A)	(72)発明者	間瀬 啓介 長野県松本市県1-9-1 公務員宿舍
(43)公開日	平成13年9月11日(2001.9.11)	(72)発明者	宮島 たか子 長野県岡谷市山手町1-16-4
審査請求日	平成12年3月3日(2000.3.3)	(72)発明者	原 和二郎 茨城県つくば市東2-16-23
		(74)代理人	100091096 弁理士 平木 祐輔 (外1名)
		審査官	長井 啓子

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 セリシンを大量に生産する蚕品種

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 「Nd系統」に、普通品種の「強健・多糸量系統」を交雑させて得られるカイコを、普通品種の「強健・多糸量系統」に戻し交配し、さらに近親交配及び選抜することにより得られる、1頭当たりの吐糸量が72mg以上であり、かつ繭層のセリシンの割合がNd系統と同程度であることを特徴とするカイコ品種。

【請求項2】 「Nd系統」に、普通品種の「強健・多糸量系統」を交雑させて得られるカイコを、普通品種の「強健・多糸量系統」に戻し交配し、さらに近親交配及び選抜することからなる、1頭当たりの吐糸量が72mg以上であり、かつ繭層のセリシンの割合がNd系統と同程度であることを特徴とするカイコ品種の作出方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

2

【発明の属する技術分野】 本発明は、セリシンを大量に生産し、かつ営繭率がよく、裸蛹や半化蛹が出現しない新規な蚕品種に関する。

【0002】

【従来の技術】 セリシンは、絹糸を構成しているタンパク質で、フィブロインが繊維を形成しているのに対し、その外側を層状に覆っているゼラチン様の物性を持つタンパク質である。普通の繭はフィブロイン約75%とセリシン約25%の2種のタンパク質で構成されている。衣料素材として利用する場合、セリシンは水溶性であるため、生糸加工の段階で大部分が除去・廃棄されており、これまではほとんど利用されていなかった。

【0003】 ところが、近年になって、セリシンが有する様々な作用が着目されるようになり、それを利用する種々の試みがなされるようになってきている。例えば、

セリシンは抗酸化作用があることから、活性酸素による食用油脂の酸化を抑える酸化防止剤として利用することができる。また、セリシンは、チロシナーゼ阻害作用があることからメラニンの生合成を抑制する美白成分として、あるいは水酸基を有するセリシンを約30%含み、保湿作用に優れていることから保湿成分として各種の化粧品に配合することも提案されている。さらには、優れた透湿性、吸湿性、風合いを付与できるという点からセリシンを定着させた衣料品が開発されている。

【0004】このように、セリシンは機能的素材として各方面で広く利用され、今後もその需要増大が見込まれることから、セリシンを大量にかつ効率よく得る方法を開発することが要望される。これまで、セリシンを生産する手法として以下のようなアプローチが検討されてきた。

【0005】第1は、セリシンを特異的に合成する突然変異種の利用である。このような突然変異種として、これまで2種が発見されており、一つは、フィブロインをほとんど合成せず、セリシンのみ(含量99%以上)を合成する裸蛹系統(「Nd系統」)であり、もう一つはフィブロイン約30%、セリシン約70%の組成から成るタンパク質を生産するセリシン蚕系統(「Nd-s系統」)である。しかしながら、いずれの突然変異種も絹タンパク質の生産量が1頭当たり30mg内外と非常に少ない上、営繭時に吐糸できず裸蛹や半化蛹となる蚕の割合が高く、正常に吐糸してセリシン繭を形成する蚕の割合が60%程度である。このため、セリシン1gを生産するには、Nd系統で約55頭、Nd-s系統で約80頭を飼育する必要がある、両系統ともセリシンの生産量が著しく低いいため、基礎的研究の材料には利用されているが、セリシン量産を目的とした実用面ではまったく利用されていない。

【0006】第2は、普通の生糸用繭(フィブロイン約75%、セリシン約25%)からアルカリ溶剤を使って直接セリシンを溶出して採取する方法であるが、この方法では生糸となるフィブロイン成分を捨てることになるので実施されていない。第3は、製糸工場で生糸を生産する際に排出する廃水から回収する方法であるが、純度の高いセリシンを得るための回収工程が繁雑であり、コストも非常に高いので実施されていない。

【0007】第4は、実際に行われている方法として、蚕品種の製造に利用された後に残る切繭から採取する方法がある。蚕品種の製造では雑種一代を作るため、採種に用いる蚕(繭)は、化蛾する前に雌雄に分ける必要があり、蛹の時期に雌雄鑑別を行っている。そのため、繭層を切開して蛹を取りだすが、切開した繭層(切繭という)は繰糸用としては利用できない。そこで、この切繭をアルカリ剤で処理してセリシンを溶出させ、精製することによりセリシンを得ている。しかしながら、繭層のセリシン含量は約25%で回収工程が繁雑であり、生産効

率は高いとはいえない。また、蚕品種の製造用に生産される繭層量は日本全体で約2トんに過ぎず、その大半がシルクパウダーに利用されるので、原料繭の確保が容易ではない(平成11年度で約500Kgの繭層がセリシン用に利用された)。以上のように、セリシンを採取するためのこれまでの方法は、いずれも実際には実施できないか、あるいは実施できても大量生産が難しく、今後益々増加が見込まれるセリシンの需要を満たすのに満足のいくものとはいえない。

10 【0008】

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、機能的素材として有用なセリシンを大量に提供するための手段として、セリシンを大量に生産する新しい蚕品種を開発することにある。本発明者らは上記課題を解決すべく、鋭意研究を重ねた結果、純度99%のセリシンを合成する突然変異種の「裸蛹系統」に、普通品種の「強健・多糸量系統」を交雑させることにより、セリシンを大量に生産する新規な蚕品種の育成に成功し、本発明を完成するに至った。

20 【0009】すなわち、本発明は、突然変異種の「裸蛹系統」に、普通品種の「強健・多糸量系統」を交雑させることにより得られる、セリシンを大量に生産する蚕品種である。以下、本発明を詳細に説明する。

【0010】

【発明の実施の形態】本発明のセリシンを大量に生産する新品種は、セリシンのみを合成する突然変異種の「裸蛹系統」と普通品種の「強健・多糸量系統」を交雑させることにより得られる。本発明において使用する突然変異種の「裸蛹系統」は、好適には「Nd系統」が挙げられ、本系統は、純度99%のセリシンを合成し、営繭率が低く、繭を作らず裸蛹となる場合が60%を越える系統である。

【0011】本発明において使用する普通品種の「強健・多糸量系統」は、通常の飼育では春蚕期の場合、幼虫の生存率及び化蛹歩合がそれぞれ95%及び85%以上となり、繭重及び繭層重がそれぞれ2g及び0.6gを越える系統であれば特に限定されないが、例えば、日本種系統の「NS2系統」や中国種系統の「CS83系統」が好適に使用される。

40 【0012】本発明において使用する上記の系統は、いずれも農林水産省蚕糸・昆虫農業技術研究所で保存されている。また、Nd系統については農林水産省ジーンバンクに登録されており、所定の手続きにより分譲を受けることができる。蚕の交雑育種は、当分野で行われている通常の方法に従い、例えば、以下のようにして行うことができる。

【0013】まず、「強健・多糸量系統」と「裸蛹系統」(「Nd系統」)とを交配し、交雑種F1を得、このF1の卵を孵化させた幼虫を飼育して営繭させる。F1では遺伝子型はNdに関してヘテロ(+/Nd)であ

って、Ndは優性であるので理論上は全てNd蚕となる。

【0014】次に、F1で得られたセリシン繭どうしをさらに交配し、交雑種F2を得、このF2の卵を孵化させた幼虫を飼育して営繭させる。F2の繭では遺伝子型は+ / +、+ / Nd、Nd / Ndが1 : 2 : 1に分離するので、理論上は1 / 4が普通繭となり、3 / 4がNd蚕となる。

【0015】さらに、強健・多糸量性を付与するため、F2で得られた「セリシン繭」を普通品種の「強健・多糸量系統」に再び交配し（戻し交配）、交雑種（BF1）を得る。BF1では、普通繭（+ / +）とNd蚕（+ / Nd）の2種が混在するので、育成したいセリシン繭（+ / Nd）について同系交配（近親交配）を3～5世代行って継代し、Ndがホモ（Nd / Nd）となる「セリシン繭」系統を選抜する。

【0016】ここで、Ndホモの確認は、ホモ（Nd / Nd）と思われる育種系統とNdに関して正常な系統（+ / +）を交配し、孵化した幼虫が全てセリシン繭（+ / Nd）になったことにより行うことができる。Ndがホモ化した後の世代は、1蛾育（1蛾区ずつ分けて飼育、混合育の対語）又は混合育による選抜を行い、裸蛹の発現率が高い蛾区及び生存率の低い蛾区は淘汰し、営繭率が高く強健性を有する蛾区を3～5世代にわたり選抜することにより、最終的に目的とする蚕品種を取得することができる。

【0017】また、上記のようにして得られた蚕品種の2種以上を常法に従って交雑させ、雑種一代（F1）を得ることができる。得られた交雑種は、原種に比べて幼虫の生育が育一化し、耐病性も増加して飼育しやすくなり、また繭重、繭層重が増えてセリシン収量がさらに増加する。

【0018】上記のようにして得られた蚕品種は、他の既存の蚕品種とDNAレベルで区別することができる。具体的には、本発明者らにより先に開発された蚕cDNAをプローブに用いて蚕染色体DNAの制限酵素断片長多型（RFLP）を検出する方法より行うことができる（特願平11-277498号）。上記方法においては、まず、蚕から常法に従って蚕染色体DNAを抽出し、これを適当な制限酵素で切断することによって、蚕染色体DNAの制限酵素断片を得る。制限酵素による蚕染色体DNAの切断は、常法に従って行うことができる。

【0019】ここで使用する制限酵素は、蚕染色体DNAを1ヶ所以上切断することができる限り、特に限定されない。使用する制限酵素は、蚕染色体DNAの塩基配列、蚕染色体DNAが由来する蚕の品種等に応じて適宜選択することができる。例えば、本発明において新たに育成した上記の蚕品種に由来する染色体DNAに対しては、EcoRIが好適に使用される。

【0020】次に、蚕染色体DNAの制限酵素断片長多型

（RFLP）を、蚕cDNAをプローブに用いて検出する。ここで、プローブに用いる蚕cDNAの塩基配列は、蚕mRNAと同一又は相補的な塩基配列である限り、特に限定されない。また、その塩基数は、蚕染色体DNAの制限酵素断片長多型（RFLP）を検出し得る限り、特に限定されないが、通常200～15000塩基であり、好ましくは300～10000塩基であり、さらに好ましくは500～5000塩基である。

【0021】蚕cDNAは、常法に従って蚕からmRNAを抽出し、蚕mRNAを鋳型とし、オリゴ（dT）をプライマーとして、逆転写酵素によって合成することができる。プローブとして使用する蚕cDNAは、その塩基配列に従ってホスホロアミダイド法等の常法に従って、化学合成することもできる。さらに、常法に従って作製した蚕cDNAライブラリーから適当なcDNAクローンを選別し、このcDNAクローンからcDNAプローブを調製することもできる。

【0022】プローブとして使用するcDNAは、蚕の28対の染色体のうち、どの染色体に座乗するどの遺伝子に由来するcDNAであってもよいが、蚕の全染色体上に一対しか存在しない遺伝子、すなわちシングルコピー遺伝子に由来するcDNAであるのが好ましい。例えば、シングルコピー遺伝子に由来するcDNAプローブとしては、配列番号1～28に記載の塩基配列からなるcDNAを例示することができる。

【0023】シングルコピー遺伝子に由来するcDNAは、例えば、蚕cDNAライブラリーから選別したcDNAクローンをプローブとして、蚕染色体DNAに対してサザンブロットティングを行い、該cDNAクローンがシングルコピーか否かを判定し、シングルコピーであるcDNAクローンを選別することにより得ることができる。

【0024】本発明でプローブとして使用するcDNAの種類は、蚕の遺伝子型を同定し得る限り特に限定されず、1種類であってもよいし、2種類以上であってもよい。複数のcDNAをプローブとして使用する場合、cDNA同士は同一の染色体に座乗する遺伝子に由来するものであってもよいが、異なる染色体に座乗する遺伝子に由来するものであるのが好ましい。すなわち、複数のcDNAをプローブとして使用する場合、蚕の28対の染色体のうち、10～28対の各染色体に座乗する遺伝子（特にシングルコピー遺伝子）に由来するcDNAを使用するのが好ましく、28対の各染色体に座乗する遺伝子（特にシングルコピー遺伝子）に由来するcDNAを使用するのがさらに好ましい。

【0025】蚕染色体DNAの制限酵素断片長多型（RFLP）の検出は、蚕cDNAをプローブとしたサザンブロット法により以下のようにして行うことができる。まず、制限酵素で切断した蚕染色体DNA断片を電気泳動（例えばアガロース電気泳動）し、該DNA断片をアルカリ変性させた後、電気泳動パターンをそのままニトロセルロース又はナイロン膜に吸着、固定させる。次いで、ニトロセルロース又はナイロン膜に固定したDNA断片に標識した蚕cDNAをハイブリダイズさせ、蚕cDNAの標識を指標として制

限酵素断片長多型(RFLP)を検出することができる。この際、蚕cDNAの標識としては、例えば、32P等の放射性同位体による放射性標識、ビオチンやジゴキシゲニン等による非放射性標識等が挙げられ、これらの標識化は常法に従って行うことができる。以下、本発明を実施例を挙げて具体的に説明するが、本発明をこれらに限定されるものではない。

【0026】

【実施例】〔実施例1〕 セリシンを大量に生産する蚕品種の育成とその生産効率

(1) 「セリシンN」の育成

「セリシンN」は、強健・多糸量の日本種系統「NS2系統」を母系統として育成した。即ち、「NS2系統」の雌に「Nd系統」(裸蛹、フィブロインを合成せずセリシンだけを合成する突然変異種)の雄を交配し、この交雑種(F1)の卵を8蛾区用意し、孵化した幼虫から1蛾区あたり100頭内外を集めて混合飼育し、4齢起蚕時に頭数整理を行い、最終的に400頭を飼いあげた。交雑種F1では遺伝子型はNdに関してヘテロ(+/Nd)であって、Ndは優性であるので理論上は全てNd蚕となるが、実際には約50%が裸蛹となり、50%がセリシン繭となった。

【0027】次に、F1で得られたセリシン繭どうしを交配してF2の卵を10蛾区採種し、孵化した幼虫から1蛾区あたり100頭内外を集めて混合飼育し、4齢起蚕時に頭数整理を行い、最終的に800頭を飼いあげた。F2では遺伝子型は+/+, +/Nd, Nd/Ndが1:2:1に分離するので、理論上は1/4が普通繭となり、3/4がNd蚕となるが、実際には、約25%が普通繭を作り、約30%が裸蛹、45%がセリシン繭となった。

【0028】さらに、強健・多糸量性を付与するため、F2で得られた「セリシン繭」の雄を普通品種「NS2」の雌に再び交配し(戻し交配という)、12蛾区を採種した。F2で得られたセリシン繭の遺伝子型は+/Nd, Nd/Ndの2種が分離するが外観からは区別できないので両者が混在しており、従って戻し交配した交雑種(BF1)では、普通繭(+/+)とNd蚕(+/Nd)の2種が混在することになる。この戻し交配の卵から孵化した幼虫を600頭飼育したところ、約40%が普通繭、60%がNd蚕(20%が裸蛹、40%がセリシン繭)となった。

【0029】以上の方法で育成したセリシン繭(+/Nd)について同系交配(近親交配)を3世代行って継代し、Ndがホモ(Nd/Nd)となる「セリシン繭」系統を選抜した。3世代とも、12蛾区内外を採種し、孵化した幼虫は混合飼育して4齢起蚕時の頭数整理を行い、400頭を飼いあげた。Ndホモの確認は、ホモ(Nd/Nd)と思われる育種系統とNdに関して正常な系統(+/+)を交配し、孵化した幼虫が全てセリシン繭(+/Nd)を作ったことにより、育成系統がNdホモ

になったことを証明できた。

【0030】Ndがホモ化した後の世代は、5~6蛾区を選び1蛾育(1蛾区ずつ分けて飼育、混合育の対語)選抜を行った。即ち、各世代とも1蛾区当たり400頭を飼い上げ、裸蛹の発現率が高い蛾区及び生存率の低い蛾区は淘汰し、営繭率が高く強健性を有する蛾区を選抜した。

【0031】このようにして選抜した蛾区について、さらに個体別にセリシン量(繭層)を調べ、その値が上位から30粒内外を選び、兄弟交配を行って採種し、次代へと継代した。このような1蛾育選抜を6世代続けた結果、営繭率がほぼ100%となる系統を確立できた。兄弟交配を長く続けると、近交弱勢(弱殖弱勢)が働き、産卵行動や生存率が低くなる恐れがあるため、その後の世代は5~6蛾区を用いた混合飼育に切り換えた。即ち、各世代とも400頭を飼い上げ、セリシン量(繭層)が上位な繭30粒内外を選び、同系交配を行って4世代継代した結果、営繭率及びセリシン量が安定して現れる系統として「セリシンN」を確立した。

20 【0032】(2) 「セリシンC」の育成

強健・多糸量の普通品種として日本種系統「NS2」系統に代えて、中国種「CS83」系統を使用する以外は、(1)と同様な方法により、「セリシンC」を育成した。

(3) 「セリシンN×セリシンC」の作出

「セリシンN×セリシンC」の交雑種の作出では、「セリシンN」及び「セリシンC」について蛹の雌雄鑑別を行ってそれぞれ雌雄に分別し、それらが化蛾した後、「セリシンN」雄×「セリシンC」雌、あるいは「セリシンC」雌×「セリシンN」雄の交雑を行い採種した。この交雑種では、どちらを母体(雌)にしても幼虫の発育速度、生存率、繭層(セリシン)の生産量は同じであった。

【0033】(4) 各品種のセリシンの生産効率
1999年の春蚕期に各品種のセリシンの生産効率を調べたところ、Nd系統は吐糸・営繭する蚕の割合が60%であるのに対し、「セリシンN」、「セリシンC」、「セリシンN×セリシンC」の営繭率はそれぞれ97%、98%、98%であった(図1)。

【0034】また、1頭当たりの吐糸量(繭層量)は、Nd系統が約30mgであるのに対して、「セリシンN」は72mg、「セリシンC」は82mg、「セリシンN×セリシンC」は95mgであった。そして、いずれの品種も繭層の練減率(セリシン量の割合)が99.0%であるので、1頭当たりのセリシン量は、Nd系統で30mg、「セリシンN」で71mg、「セリシンC」で81mg、「セリシンN×セリシンC」で94mgとなり、Nd系統に比べて「セリシンN」では2.4倍、「セリシンC」では2.7倍、「セリシンN×セリシンC」では3.1倍(「セリシンN」の1.3倍、「セリシンC」の1.2倍)と大幅に向上した(表1)。

【0035】

【表1】

品種	1頭当たりの 繭増量 (mg)	繰減率 (%)	1頭当たりの セリシン量 (mg)	Nd系統に対する セリシン分泌量 の増加率 (倍)
Nd (標準)	30	99.0	30	1.0
セリシンN	72	99.0	71	2.4
セリシンC	82	99.0	81	2.7
セリシンN ×セリシンC	95	99.0	94	3.1

【0036】1頭当たりのセリシン量と営繭率をもとに、1000頭当たりのセリシン生産量（1頭当たりのセリシン量×営繭率/100×1000）を算出すると、Nd系統が18.0gであるのに対して、「セリシンN」で68.9g、「セリシンC」で79.4g、「セリシンN×セリシンC」で92.1gとなり、セリシン生産量はNd系統に比べて「セリシンN」では3.8倍、「セリシンC」では4.4倍、「セリシンN×セリシンC」では5.1倍（「セリシンN」、「セリシンC」に対しては1.2倍）と大幅に向上*

10*した。従って、1Kgのセリシンを生産するのに必要な蚕の数は、Nd系統では約55,600頭であるが、「セリシンN」で約14,500頭、「セリシンC」で約12,600頭、「セリシンN×セリシンC」で約10,900頭となり、それぞれ飼育数を大幅に減少できるので、労力は大きく軽減される（表2）。

【0037】
【表2】

品種	1頭当たりの セリシン量 (mg)	営繭率 (%)	1000頭当たり セリシン 生産量 (g)	Nd系統に対する 生産性の 増加率 (倍)	セリシン1Kgの 生産に要する 飼育数 (頭)
Nd (標準)	30	99	18.0	1.0	55,556
セリシンN	71	97	68.9	3.8	14,514
セリシンC	81	98	79.4	4.4	12,594
セリシンN ×セリシンC	94	98	92.1	5.1	10,858

【0038】〔実施例2〕 遺伝子型による蚕品種の識別(1)

「Nd系統」、及び実施例1にて育成した「セリシンN」と「セリシンC」について、以下のようにして遺伝子型の同定を行った。

【0039】(1) 染色体DNAの調製

5齢3日幼虫の蚕を雌雄関係なく、「Nd系統」、「セリシンN」、及び「セリシンC」からそれぞれ4個体を選別し、これらの蚕から以下のようにして染色体DNAを抽出、調製した。

【0040】5齢盛食期の蚕を解剖し、後部絹糸腺を取り出した。後部絹糸腺を液体窒素を入れた乳鉢中で磨細した後、組織重量（100-200mg）の10~20倍量（1.0~1.5ml）の溶液（50mM EDTA、0.5% SDS及び200μg/ml Proteinase Kを含む）中に懸濁し、50℃で1時間放置した。蒸留水で飽和したフェノール溶液を等量加えて処理し（1回）、20分間攪拌した後、冷却遠心分離機によって1200rpmで10分間遠心分離し、上清を回収した。2-ブタノール処理により0.5ml以下に濃縮し、1/10容量の3M NaOAcを加えた後、2倍量以上のエタノールを加えてDNAを巻き取った。得られたDNAを1mlの緩衝液（組成：10mM Tris-HCl, pH 7.5, 1mM EDTA）中によく溶かした後、RNase A 5μg及びRNaseT1 3μgを加えてRNAを分解した。等量のフェノールクロロホルム液を加えて10分間攪拌した後、微量冷却遠心分離機によって12000rpmで10分間遠心分離

し、水層（DNAを含む）を回収する操作を2回繰り返した。得られた水層を2-ブタノールで400μl程度まで濃縮し、1/10容量の3M NaOAcを加えた後、2倍量のエタノールを加えてDNAを回収した。回収したDNAを200-400μlの緩衝液（組成：10mM Tris-HCl, pH 7.5, 1mM EDTA）を加えて良く溶かした後、得られたDNA量を定量した。その結果、「Nd系統」、「セリシンN」、「セリシンC」の各染色体DNAがそれぞれ約40~100μg、約50~100μg、約70~120μg得られた。

【0041】(2) 制限酵素による染色体DNAの切断と制限酵素断片の電気泳動

「Nd系統」、「セリシンN」、「セリシンC」の各染色体DNA 1μgを、EcoRI 20ユニットで37℃、1時間酵素処理した。制限酵素で処理した各染色体DNA 1μg（10μl）をアガロースゲルの各レーンに入れ、分子量マーカー及びDIG（ジゴキシゲニン）マーカーを含む溶液5μlを一番端のレーンに入れた。電気泳動システム（宝酒造社）を用いて50-75V（50-80mA）で約2~3時間電気泳動した。

【0042】(3) プロットニング

電気泳動後、DNAのプリン塩基を部分的に切断するために、DNAを0.1~0.2N HClと15~30分間（BPBが青から黄色に変わる前ぐらいまで）反応させた。さらに、DNAを二本鎖から一本鎖へと変性させるために、DNAを十分量の0.5N NaOH及び1.5M NaClと反応させた（15分間で2回

又は30分間で1回)。

【0043】事前に20×SSCに浸しておいたフィルター上へ電気泳動後のゲルを乗せ、Vacuoblot system (LKB社)を用いて60分間以上吸引することによりフィルター上にDNAをトランスファーした。その後、紫外線で3~5分間処理するか又は120℃で1時間処理するか、あるいはその両方の処理を施することによりDNAを固定化した。塩を除くため2×SSC及び0.1%SDSを含む溶液中で、フィルターを37℃で30分間インキュベートした。

【0044】(4) cDNAプローブの調製

(4-1) プローブe66の調製

胚発生3日目の蚕に由来するcDNAライブラリーを以下のように作製した。胚発生3日目の蚕からフェノール法により核酸を調製した後、LiClを用いた沈殿によりRNAを調製した。次いで、oligo(dT)カラムによりmRNAを調製し、これを出発材料としてPromega社のcDNA合成キットによりcDNAを合成し、λファージをベクターとしてcDNAライブラリーを作製した。

【0045】cDNAライブラリーからcDNAクローンを無差別に選択した。ゲノムDNAを用いたサザンブロット法により、無差別に選択したcDNAクローンがシングルコピー遺伝子であるか否かを確認した。そして、シングルコピー遺伝子由来のcDNAクローンからジゴキシゲニン標識リボプローブを調製した。

【0046】cDNAクローンからのプローブの調製は、以下のように行った。まず、目的のcDNAを含むファージを培養液20ml中で一晚培養した後、ポリエチレングリコールを加えファージを沈殿させて回収した。回収したファージを0.6g/mlのCsCl密度勾配液中で超遠心により精製した。精製したファージを0.5% SDS及び100mg/ml Proteinase Kを用いて65℃で1時間処理して破壊した後、溶液中のファージDNAを1g/mlのCsCl密度勾配液中で超遠心して精製した。得られたファージDNAをEcoRIで酵素処理して、ファージDNAに組み込まれている蚕のcDNAを切り出した。切り出した蚕cDNAをプラスミドpGEM3zf(+)に組み込み、該プラスミドを大腸菌に導入して培養した後、プラスミドDNAを精製した。プラスミドDNAをHindIIIで処理して得られるDNA断片を鋳型とし、DNAラベリングキット(ペーリンガー社)を用いて(又はT7, T3 SP6ポリメラーゼによるin vitro transcriptionにより)ジゴキシゲニン標識リボプローブ(プローブe66)を調製した。プローブe66の塩基配列を配列番号14に示す。

【0047】(4-2) プローブm210の調製

胚発生3日目の蚕に代えて、受精させずに産下させた卵からフェノール法により核酸を調製する以外は、上記(4-1)と同様にして不受精卵由来のcDNAライブラリーを作製後、ジゴキシゲニン標識リボプローブ(プローブm210)を調製した。プローブm210の塩基配列を配列番号15に示す。

【0048】(5) RFLPの検出

以下のようなプレハイブリダイゼーション溶液を調製した。

		最終濃度
20×SSC	2.5ml	5×SSC
ホルムアミド	5.0ml	50%
10%SDS	0.5ml	0.5%
ブロッキング溶液	1.0ml	0.1%
DD Water	1.0ml	
Total	10.0ml	

10

なお、ブロッキング溶液は市販のDNA検出キットに含まれているものを使用した。

【0049】このプレハイブリダイゼーション溶液をフィルター1cm²あたり0.1~0.2ml(フィルター1つあたり約10ml)を用いて、上記(3)でDNAをプロットしたフィルターを37~42℃で1時間以上インキュベーションし、プレハイブリダイゼーションを行った。

20

【0050】その後、プレハイブリダイゼーション溶液1mlあたり50ng以下のプローブE17を加え、42℃で5時間以上、ストリンジェントな条件下で反応させ、プローブE17をハイブリダイズさせた。ハイブリダイゼーション後、2×SSC及び0.1% SDSを含む250mlの溶液を用いて室温で20分間の洗浄を2回行い、次いで、0.1×SSC及び0.1% SDSを含む250mlの溶液を用いて65℃で20分間の洗浄を2回行った。

30

【0051】その後、少量の洗浄用緩衝液(組成:0.1M maleic Acid-NaOH, 0.15M NaCl, pH 7.5, 0.3% tween 20)で洗浄し、緩衝液2(組成:0.1M maleic Acid-NaOH, 0.15M NaCl, pH 7.5, 0.3% tween20)と1/10量の緩衝液2に溶かした10%ブロッキング試薬を混合した溶液100ml/100cm²とを用いて30分間洗浄した。

40

【0052】1/10000抗体(Anti-DIG-Alkaline phosphatase conjugate:抗DIG抗体とアルカリホスファターゼとを結合させたもの)、緩衝液2で希釈した溶液100mlのうちの10μl、をフィルターと反応させた後、洗浄用緩衝液100ml/100cm²を用いてフィルターを2×15分間洗浄し、洗浄したフィルターを40~50mlの緩衝液3(組成:100mM Tris-HCl, 100mM NaCl, pH9.5)に3~5分間浸し平衡化した。

50

【0053】そして、10ml/100cm²の基質溶液、CSPDを100倍量の緩衝液3に溶かし、これをフィルターと反応させた。空気乾燥させるか、又はプラスチックフィルム内の液を除去した。37℃で15分間放置した後、カセットにいれてX線フィルムに露光し、現像した。

【0054】(6) 結果

得られたRFLPパターンを図2に示す。なお、図2中、Mは分子量マーカを表す。図2に示すように、プローブe66による同定(パネル1)では、「セリシンN」に3.0kbの位置に、「セリシンC」では10.5kbの位置に、「Nd系統」では見られない特異的なバンドが認められ

た。

【0055】また、プローブm210による同定（パネル2）では、「セリシンN」、「セリシンC」共に13.5kbの位置に、「Nd系統」では見られない特異的なバンドが認められた。これらの結果より、制限酵素EcoRIでゲノムDNAを切断し、蚕cDNAクローンをプローブとするRFLPによれば、e66及びm210などのクローンについては品種間で異なるバンドパターンが得られ、「セリシンN」及び「セリシンC」とも元の「Nd系統」と遺伝子型を明確に区別することができた。

【0056】〔実施例3〕 遺伝子型による蚕品種の識別(2)

(1) 蚕染色体の調製

「セリシンN」、「セリシンC」、「Nd系統」、ならびに普通品種の「日01号」、「支137号」の各品種の蚕から、実施例2と同様の方法により28対の染色体DNAを調製した。

【0057】(2) 制限酵素による染色体の切断と制限酵素断片の電気泳動

各染色体DNA 1 μ gを制限酵素(EcoRI)20ユニットと37℃で1時間処理し、制限酵素断片を実施例2と同様の方法により電気泳動した。

(3) プロッティング

電気泳動後、実施例2と同様の方法によりプロットングした。

【0058】(4) cDNAプローブの調製

胚発生3日目及び蚕の不受精卵のcDNAライブラリーから、28対の各染色体DNA上に座乗し、かつ全染色体上に一対しか存在しないシングルコピー遺伝子に由来するcDNAクローンを選別した。これらのcDNAクローンから実施例2と同様にしてジゴキシゲニン標識リボプローブを調製した。調製したプローブは、プローブm47（配列番号

1)、プローブm19（配列番号2）、プローブe97（配列番号3）、プローブm101（配列番号4）、プローブe45（配列番号5）、プローブ3L（配列番号6）、プローブe53（配列番号7）、プローブe12（配列番号8）、プローブe42（配列番号9）、プローブm82（配列番号10）、プローブe90（配列番号11）、プローブm65（配列番号12）、プローブm23（配列番号13）、プローブe66（配列番号14）、プローブm210（配列番号15）、プローブm59（配列番号16）、プローブe89（配列番号17）、プローブm142（配列番号18）、プローブm202（配列番号19）、プローブm238（配列番号20）、プローブm81（配列番号21）、プローブm138（配列番号22）、プローブm198（配列番号23）、プローブm111（配列番号24）、プローブm183（配列番号25）、プローブm67（配列番号26）、プローブm199（配列番号27）、及びプローブm112（配列番号28）である。

【0059】なお、配列番号1の53番目及び166番目、配列番号7の155番目及び174番目、配列番号15の120番目及び217番目、配列番号18の95番目及び133番目、配列番号19の22番目及び44番目、配列番号28の229番目における「n」で表される塩基は、「a」、「c」、「g」、「t」及び「u」のいずれかの塩基を表す。

【0060】(5) RFLPの検出

「セリシンN」、「セリシンC」、「Nd系統」、「日01号」、及び「支137号」の28本の各染色体のRFLPを、上記プローブを用いて実施例2と同様の方法により検出した。

(6) 結果

検出された各染色体のRFLPのバンドサイズを表3に示す。

【0061】

【表3】

遺伝子型による品種の識別（各染色体のcDNAによって検出されたRFLPのバンドサイズの違い）

配列番号	Probe	Nd	セリシン-N	セリシン-C	目01号	支187号
1	m47	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
2	m19	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
3	e97	23.0, 4.8			23.0, 4.8	6.5, 4.8
4	m101	3.0	3.0	3.0		
5	e45	(3.3), 2.7	3.3, (2.7)	(3.3), 2.7	3.3	(3.3), (2.7)
6	3L	6.0			12.0, 2.5	5.5, 2.5
7	e53	13.0, (9.0), (7.5)		13.0, 9.0	17.5, 9.0	11.0, 7.5
8	e12	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
9	e42	21.0, (6.5), (5.5), (5.9), (3.8), (2.1)			11.5, 6.5	21.0
10	m82	6.0	6.0	6.0		
11	e90	9.0			23.0	11.0
12	m65	5.8		5.8	6.8	6.8
13	m23	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
14	e66	8.0			2.5	9.5
15	m210	25.0				
16	m59	(7.8), 4.8		7.8	5.2	7.8
17	e89	10.0			3.0	13.0, 0.5
18	m142	5.7	5.7	5.7		
19	m202	1.0		1.0		
20	m238	14.0, 2.5, 1.5, 1.0				
21	m81	3.4	3.4	3.4	4.0, 2.5	4.0, 2.5
22	m138	17.5	17.5	17.5		
23	m198	11.0, 4.2, (1.0)	(11.0), 4.2, (1.0)	11.0, 4.2, 1.0		
24	m111	19.5	19.5	19.5	19.5	(19.5), (13.0)
25	m183	6.8				
26	m67	1.3			1.3	23.0
27	m199	8.0		8.0	8.0	8.0
28	m112	16.0		16.0	20.0	9.5

() は品種内で多型が見られるバンド。網掛けはNdのバンドパターンと異なる場合を示す。配列番号はRFLPによる連関群を表す。

【0062】表3に示すように、用いたプローブのうち、特にプローブe66については「セリシンN」で3.0Kbの部位、「セリシンC」で10.5kbの部位に、プローブm210については「セリシンN」及び「セリシンC」共に13.5kbの部位に、それぞれ品種固有のバンドパターンが検出され、Nd系統や他の普通品種とは遺伝子型が異なることが確認された。また、プローブe66及びm210以外に、「セリシンN」ではe97、3L、e53、e42、e90、m65、m23、m59、e89、m202、m238、m183、m67、m199、及びm112においても、また「セリシンC」ではプローブe97、3L、e42、e90、e89、m238、m183、m67においても、染色体領域で異なる遺伝子構成をもち、DNAレベルで

40

他の品種と異なる品種であることが確認された。

【0063】

【発明の効果】本発明により新たに育成されたセリシンを大量に生産する蚕品種によれば、機能性材料として各産業界で需要の高いセリシタンパク質を高効率で生産できる。また、これらの品種は蚕染色体DNAの制限酵素断片長多型(RFLP)を、蚕の28対の各染色体に座乗する遺伝子に由来する蚕cDNAをプローブに用いて検出することにより、他の蚕品種と区別することができる。

【0064】

【配列表】

Sequence Listing

<110> Director General, National Institute of Sericultural And

17

18

Entomological Science

<120> Silkworm race capable of producing a large amount of sericin

<130> P99-0622

<160> 28

<210> 1

<211> 257

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<221> n

<222> 53

<223> a, c, g, t or u

<220>

<221> n

<223> 166

<220> a, c, g, t or u

<220>

<223> probe m47

<400> 1

ttttttatt tcatttcacc ggaatgtaaa acggtgcgag tgcgcataa aanatattc 60
 attggcttag tactcttcgg ctccctcacc ctgccttca gggagtcca tgccgacttc 120
 ttcgtaatcc ttctcgaggg cagccaggtc ctacgggct tcgganaact ctccctcctc 180
 cataccctca ccgacgtacc agtgcaagaa agcagccttg gcgtacatga ggtcgaactt 240
 gtggtaagg cgagccc 257

<210> 2

<211> 240

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe m19

<400> 2

gtttatagaa agtttaatta atcatagaag tatttgaaaa atatctccag tgaatgtaat 60
 aacaacaaa ttaaaacaat aaatttgggt aggtactaac ataattatga cttttacact 120
 atactaggtt aataagtcta gggtaataat taactaaaat ttccittaat ataaatacac 180
 taggtgaagt gaatgtttac aagtcaaaag ttccittaagt tatagctaac acagtacaaa 240

<210> 3

<211> 246

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe e97

<400> 3

tttcgggcta tgtaaacacc aataaatatt tacgaggta cagcccaaga tgiccattca 60
 catcaaagat tccgacgacc tgaagacaag gctggcggaa gccggggaca agctcgtcgt 120
 gatcgacttc atggcgacct ggtgocggacc gtgcaagatg atcgggccta aactggacga 180
 gatcgccgcc gaaatgtcag attccatcgt cgttgtcaag gtggacgttg atgagtgcca 240
 ggacat 246

<210> 4

<211> 243

<212> DNA

19

20

<213> Artificial

<220>

<223> probe m101

<400> 4

ttttttttt ttttttttg aacatccgta aaaaccactg tttatatatt agtatagatt 60
 agtataccgt ttatgattta ttgggttaa atcacaata tttcacatta tgcctttaa 120
 atccagaaat aggaaggata ttaaaataaa taatcagcga caaaacaaat aggcatatga 180
 cactgtacta tgggaacaga gatagttaca catactttaa tatgtttaa taaataaaga 240
 aat 243

<210> 5

<211> 249

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe e45

<400> 5

tcctcttgac gtgaaggacg atctttgtac ctgaccaag gggctcaccg ctgtctgggc 60
 ggactgtgaa cgagcctcct gcaaagattc ccacacgtat tgctcgtcgt cattgtgttt 120
 agagtgaaca gtcacgcggt cagcgaccaa gtaactggag tagaagccaa caccgaactg 180
 tccaatcatg ctgatgtcgg cacctgcttg aagagcctcc atgaaagctt tagtaccaga 240
 tttcgcgat 249

<210> 6

<211> 248

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe 3L

<400> 6

atcgaacaag atagatggcc gagaacaaat gaggagacac cgtccgtcaa caacgcgtaa 60
 atcgacagtg agttcagcaa acgtcattta gtgaatggat tgggaagtgt ttgtgttg 120
 actgaattgt gataacgtag tgtcggcct tggggccgaa aatctgcgac ggaaaatacg 180
 gacgtgagcc ggcgggctg cgggcccgcg atgagcgcca acaattgcca cagtatgaca 240
 tatttttc 248

<210> 7

<211> 249

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<221> n

<222> 155

<223> a,c,g,t or u

<220>

<221> n

<223> 174

<220> a,c,g,t or u

<220>

<223> probe e53

<400> 7

gaggctagt tcagatgatg agagctcaga gacaagacat gaatctgacg gcgctcgcca 60
 gtactgaacc cagcaacag gatctgctgg cgtttcttga cgacgaactg acgccgaaca 120

21

atcaggaaga gcaaaaacgt tgtgogaagc tgaanggoga tctogatact tatnaatggg 180
 atggctctgcg cgatcatact gatatcgcta tagatgacga tctctggcgt cgtttaagta 240
 cgacaaagc 249

<210> 8

<211> 245

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe e12

<400> 8

gtggatccga gtttggctga aaaacaaagg atgctgaaaa aagcacgatt agcggatcaa 60
 ctcaatgacc agctttcaca cagacctggt cctttggagc tcatcaagaa gaacatactt 120
 cacactgagg agaatataga aactgcagtt aaaagtggaa tactcgatt taaagcgacc 180
 agcgagggcg cttccggccg accccaacat ccttcctcgt actgtggacc acccgatgaa 240
 ttatc 245

<210> 9

<211> 241

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe e42

<400> 9

cggtataat caacatttca tattcgtcca ttcgtttga gctaagtgtt ctgtaacga 60
 gttgttgaag tgagttgca ggaggtagac gacggcctcg tacgtggaca tcatgatggc 120
 ggtgttcggt atctgcctca cactgcgtcc cagaccctg taactccacg gtatccttct 180
 tccatccaca ctgtatgaag agtttgccac aatctccgat acttatcacc ttcttctct 240
 c 241

<210> 10

<211> 253

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe m82

<400> 10

aaaatatgaa aacgtaactt tattattttc agtacataat tgttattttt atatgaagat 60
 tctataactc tgatagaatt aggtttaaat gttttgtcta ataaccgttt ttgaatatat 120
 tgttatattt caittcgaag caaactttta agaatctctc aataatctaa attaacctgt 180
 tactcgttgg ataactcatg taagttcatg taatgctcga catatattat gtacatacaa 240
 cagataattt gtc 253

<210> 11

<211> 244

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe e90

<400> 11

cgtctagtgg agccgccata gttcggcagc acaaacactca gaactatggc gtctagtgga 60
 gccgcacggc gggcgccacc aacatccatt ttattccaag aagcagttac attcaggtaa 120
 ggtggaacct tcaaaagcaa ttgagatttc gccggaattc cggggcgtct agtggagccg 180
 ccatagttcg ccagcacaac actcagaact atggcgtcta gtggagccgc accggcggcg 240

23

24

ccac 244

<210> 12

<211> 251

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe m65

<400> 12

attaaatgat actatittta ttaccgtctt agtattaaga caaagtgcc gtaacacgga 60
 cacacataca tgcctagaa tacattcagg tattacgaca tacgtcttta accatataaa 120
 tatctataca gcatctatat gtacaacagt atgtgtgtcg gatggatcct ctgtgttata 180
 atctgattag cgagcctgtt gttttgagga cctcatctat tcggaacgga gccttcaacta 240
 tgtgaacact c 251

<210> 13

<211> 257

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe m23

<400> 13

agttttaaaa gtttattgtc ctttaacccta ctgcgcgccg accttggctg cgatgcgctt 60
 gtcccgtcc tcggcgatgg tgaggcggat gcccttgccg cgccgcagcg agatgtacgc 120
 ctctgtgcc ttgccgatta tgaacacgtt gttcaacctc gtggcgaagg tgtgtcccg 180
 ggagtccttg atgtgcacaa tgtcgaagga gcgggatgt ctctcgccgg acacgatggt 240
 gcccacacgc cccaagt 257

<210> 14

<211> 243

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe e66

<400> 14

cggtttgta ataaatttgt aattggaata gttccaaaat aattatata cttaaattat 60
 aaaaggtaat ctaatataat gtaattcat gtatatttca aagataattt tgtacttaca 120
 atactaataa aacataacat agatgtgttt aacttaatt taaatatac cccattcctg 180
 acaccttga tttataaatg ctgcagaatt tttataaaag tcaaaaagag tctagagaaa 240
 tgt 243

<210> 15

<211> 250

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<221> n

<222> 120

<223> a, c, g, t or u

<220>

<221> n

<223> 217

<220> a, c, g, t or u

<220>

25

26

<223> probe m210

<400> 15

acaaacatca ataaagcttt atticattta titaagaaaa aatgttttatt ataaatagat 60
 gttgttgta ttgttgaatc gtttaagctta agcgacgtgt agtagagtgt aaatgacgan 120
 attgaagfac agcatgtgca ctagaagcag gagaaccttg tcgctcatt tctttttggc 180
 gtccttcaaa ccggcgcccg cgttgaactt gaagaanatg atgtcgccat cctcgacgac 240
 gtaattacga 250

<210> 16

<211> 242

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe m59

<400> 16

gatgaagaaa tatgttttat ttaattttta gtataaaaagt cacagaagtg tgtaatgtaa 60
 attacaacct tcaaatgat atcagtaaga aagattaaca caaatggat tacttttaca 120
 tttctagta ttttaggcac aatgaaatga aacaatgca ttagtataaa aggggacaac 180
 aacagcgata attatcatat ttaggttcac tttccaacac taacattaca cagtgaacg 240
 ta 242

<210> 17

<211> 245

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe e89

<400> 17

tatttacgag gtacaaataa caggtaccaa agtaggtctc tccacaagcc cagagcgcc 60
 ccaaagttag gaccatttt ctcgtcttt actaactaat tttgtgttt ttctgcta 120
 ctaaacagc caagatttg atatttcgca atagactgag cgtatgtaaat aattgaaact 180
 caaaaaatga aaaccagact ttaggttgt ttcttagta cttttctggt ttctttata 240
 tgttt 245

<210> 18

<211> 253

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<221> n

<222> 95

<223> a,c,g,t or u

<220>

<221> n

<222> 133

<223> a,c,g,t or u

<220>

<223> probe m142

<400> 18

aaacggcggg tcagccccc acccctatta agtagttgc tctgttttcg aatgactaat 60
 ggtatataig cgtcacgta agctttcaac agcanatgc tcaacagtat tgtattttgg 120
 ctgcaccgct canacttcaa cgcgcaatg cgtaactaca cgtaatacga tctcccgtc 180
 gcgctcggg atctgcccga agcgtcgcga ccgataacat tttgatgggt tcaaatgca 240

27

28

aagtgaataa tta 253

<210> 19

<211> 249

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<221> n

<222> 22

<223> a,c,g,t or u

<220>

<221> n

<222> 44

<223> a,c,g,t or u

<220>

<223> probe m202

<400> 19

attgggtacg ggccccctc tnagactoga cacatctttg tacnggttct cgaactcgtc 60
 gatagtgttg tccgctggga cggcgtctgt atctctggg agtgtgatga tgacgtcagc 120
 cgcgggtttg tctgtacgc tactgtcgc aggctcgtcc ttcgacagtt gcggttctag 180
 tttaatgttt atttctgttt cggttgatga ggctcagccc ggcgagacct ttgcagcagc 240
 gatccccgc 249

<210> 20

<211> 248

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe m238

<400> 20

gaattcggca cgatagctgc gatttgtgt tatgtattga ttgagtttc acaattcata 60
 aggtacatta gccacaatgg ctactctctg cagaacagct gtaattaaag ttatcagccc 120
 aactcagggt acaaaaatag cagcatgtac gttgtacaa aatagaatat ctccgggccc 180
 gccatgcccg aagcgtacc acctctcca ccgaaacctg caccctttga ctatgtgaac 240
 aaggacta 248

<210> 21

<211> 252

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe m81

<400> 21

aatgcttct ctaattaat tatacaactc tctactcct tctccgaaaa tgactgacat 60
 gacgtaaca tcagttacca atatagaaaa atacaggtaa taaaataatt atggaagtat 120
 tattatataa gctaaataat aaacattaca aaaatgttga tacaccaca ggaaccgccc 180
 cggaatatga atcaagagtt tttgggtacg tgtgtatcaa tagtaaaaa tcagtctaaa 240
 gaagtaggta aa 252

<210> 22

<211> 245

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

29

30

<223> probe m138

<400> 22

aatacaaaag tttattggtg aaaacatgaa aaatagata gattaattta atggttgata 60
 aaatgcagca gaaatgttac aatattggcc atcacaaaac ttttttcta ataatgcct 120
 gaatatcaag aaaatgctat atatattata tagtacaaat taccttcagg cacaacaaaa 180
 tagttaatgt cagataactt fggactaca atttgagaaa attacaagaa cgagacacta 240
 acaaa 245

<210> 23

<211> 248

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe m198

<400> 23

atattttaat atttttttca taaaaacaca ttttaaaatt ggccatatta tacaggtaag 60
 tgtactacaa gttaacagtt tatttctaca acgtagttgt cgttgatagc cgtcaatgaa 120
 attatattag atcgaattca gaaacgtcat agcgactggt ttgtcgcacg gacgcggctt 180
 actcgatgat cggatttctc aaaaaaaccc cagatactgt gattagcggg ttttaagtat 240
 ttgaaaaa 248

<210> 24

<211> 234

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe m111

<400> 24

gaacatccgt aaaaaccact gtttatatat tagtatagat tagtataccg tttatgattt 60
 atttggttaa aatcacaaat attcacatt atgcctttaa tatccagaaa taggaaggat 120
 attaaaataa ataatcagcg acaaaacaaa taggcatatg aactgtact atgggaacag 180
 agatagttac acatacttta atagtfttaa ataaataaag aaataagcac tcca 234

<210> 25

<211> 248

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe m183

<400> 25

catttttacc gggccccccc tataatgata gctctgagtc gagccctgag atcagcactg 60
 tcgtaccagc attgtcggcg acagcggacg gcagtctccg gaccgagact gcaaaagctt 120
 cggctgctgc ggccttccitc ccggctgtgc gacgcggcg cggaagctg ctctcgccat 180
 tagcatttca ccagcccctc ctgctttttt tttttctttt tcgatacatg tttctttttc 240
 ttagtctc 248

<210> 26

<211> 270

<212> DNA

<213> Artificial

<220>

<223> probe m67

<400> 26

ttttttttt tttttttta acaaaataac tgaacagtat attaaataac tatatagtta 60

31

32

```

aaaataacag tgcaggggcg taccaagaca gtttttccgt attagattct gtcacagagg 120
cggattitaga aataggtata gggattaata caatgatata ttigacaacg gttttaagaa 180
tatcttataa ttgacctaat tatacacata aaccattctt aattgataaa aatggataaa 240
gtgacaatgc gtaaacattt cacttgcaga 270

```

```

<210> 27
<211> 250
<212> DNA
<213> Artificial
<220>
<223> probe m199
<400> 27

```

```

atittactta aacattttat tgaaaaaaa gaatgatcga aggcaacatg gtatttattt 60
aatttggcga taatgacaag gggtagacta acgtggcgag ccaccacggc cgcggcgcaa 120
cggatggcac ttacggtcac acggcacgctc tgccacacgg gacaccaaca actaaacgcc 180
accgcttcaa tggaatgcct tgtaaacctta aaattaacat ttaaaaatcc tatactcttt 240
ctatttcgga 250

```

```

<210> 28
<211> 248
<212> DNA
<213> Artificial
<220>
<221> n
<222> 229
<223> a,c,g,t or u
<220>
<223> probe m112
<400> 28

```

```

aaataactta tatttctcta aacaaaataa cagcaagaca icctttgtac aatgactaat 60
atacttttgc attaatgctt tatgcatcct gctgaatcag gaggaattcc aagctcttca 120
tcagtccatg tactgggatc aaataaaggc cactcaccag ttatatgctc aggttcagtt 180
gcaatgtgat acagaatcca ccaccagcac aatccaccaa gcccttganc taaccgaatc 240
gatttttt 248


```

【図面の簡単な説明】

【図1】「Nd」, 「セリシンN」, 「セリシンC」, 「セリシンN×セリシンC」の各蚕品種の管繭状態を示す。


【図2】「Nd」, 「セリシンN」, 「セリシンC」の各蚕染色体DNAの制限酵素断片長多型 (RFLP) パターンを示す。

【図1】



標種 (Nd)、セリシンN、セリシンC及び「セリシンN×セリシンC」の管繭状態

【図2】



フロントページの続き

- (56) 参考文献 Takei F. et al., J. Cell Biol., vol. 99, p. 2005-2010 (1984)
 有賀久夫著「養蚕学大要」(昭和36年6月5日養賢堂発行)第91-95頁
 仲野良男, 日蚕雑, 第20巻, 第232-248頁
 伊藤智夫「家蚕生化学」(昭和59年裳華房発行)第158-163頁

- (58) 調査した分野(Int.Cl.⁷, DB名)
 A01K 67/033 501
 JOIS (JICSTファイル)